



Realização:



Apoio:



XVII CIC
X ENPOS

Conhecimento sem fronteiras
XVII Congresso de Iniciação Científica
X Encontro de Pós-Graduação
11, 12, 13 e 14 de novembro de 2008

Prevalência de perda de peso e sintomas relacionados à ingestão de alimentos apresentados pelos pacientes oncológicos internados no Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI)

Autor(es): LAZZERI, Bruna; VARGAS, Bianca Languer; DESTRI, Kelli; DUVAL, Patrícia Abrantes

Apresentador: Bruna Lazzeri

Orientador: Patrícia Abrantes Duval

Revisor 1: Maria Cecília Formoso Assunção

Revisor 2: Lúcia Rota Borges

Instituição: Universidade Federal de Pelotas

Resumo:

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é uma das maiores causas de mortalidade em todo mundo. No Brasil, o câncer apresenta-se como a segunda maior causa de morte nos últimos anos. Este trabalho teve como objetivos descrever a prevalência dos principais sintomas relatados pelos pacientes internados no Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) Oncológico do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas-RS e verificar a associação com tipo de câncer e perda de peso. O PIDI Oncológico atende a pacientes com diagnóstico de câncer através de uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento nutricional é realizado através de visitas domiciliares semanais feitas por um nutricionista do Hospital Escola e três estagiárias da Faculdade de Nutrição/UFPel. A perda de peso e os sintomas foram coletados através da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), segundo questionário padronizado por Ottery, 2001, sendo que os sintomas avaliados através deste instrumento foram: anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, xerostomia, mucosite, disfagia, saciedade precoce, alteração do paladar e dor. Foram avaliados 43 pacientes internados no período de janeiro a julho de 2008, sendo 53,5% do sexo masculino, com média de idade de 62 anos. O tipo de tumor mais prevalente foi de pulmão, representando 28% da amostra. Os sintomas mais frequentes apresentados pelos pacientes foram saciedade precoce (88,4%), xerostomia (83,7%) e anorexia (69,8%). A perda de peso foi constatada em 74,4% dos pacientes, sendo que os portadores de tumores de pulmão e do sistema digestivo apresentaram maior prevalência de perda de peso, ambos com 28%. É de grande relevância ter-se conhecimento da prevalência dessas complicações clínicas nos pacientes internados no PIDI Oncológico, para que a intervenção nutricional, juntamente com ação da equipe multidisciplinar, possa amenizar a gravidade do quadro, auxiliando dessa maneira na evolução do tratamento e alívio dos sintomas.